



{{customText[Cher Monsieur | Chère Madame | Cher(e) Docteur(e) | Cher(e) Professeur(e)]}} {{accLname}}

J'ai le plaisir de vous informer qu'un nouveau mode d'administration d'Opdivo® par injection sous-cutanée est bientôt disponible pour vos patients atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules **localement avancé ou métastatique après une chimiothérapie antérieure**.

Cette nouvelle voie d'administration aux côtés d'Opdivo® IV est pensée pour optimiser la prise en charge de vos patients.

**Opdivo® SC est indiqué :**

En monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules localement avancé ou métastatique après une chimiothérapie antérieure.<sup>1</sup>

**La place dans la stratégie thérapeutique d'OPDIVO® (nivolumab) 600 mg, solution injectable pour administration par voie sous-cutanée, est identique à celle de OPDIVO® 10mg/ml (nivolumab) solution à diluer pour perfusion.<sup>2</sup>**


**Place dans la stratégie thérapeutique d'OPDIVO® IV :**

- Opdivo® est un traitement de 2<sup>ème</sup> ligne du Cancer Bronchique Non à Petites Cellules (CBNPC) de type épidermoïde localement avancé ou métastatique après une chimiothérapie antérieure. Les patients présentant des mutations tumorales d'EGFR ou d'ALK doivent avoir reçu préalablement un traitement autorisé pour ces mutations.<sup>3</sup>

- Opdivo® est un traitement de 2<sup>ème</sup> ligne du Cancer Bronchique Non à Petites Cellules (CBNPC) de type non épidermoïde localement avancé ou métastatique après échec d'une chimiothérapie antérieure chez les patients avec un score ECOG de 0 ou 1. Les patients présentant des mutations tumorales d'EGFR ou d'ALK doivent avoir reçu préalablement un traitement autorisé pour ces mutations.<sup>4</sup>


- En 2<sup>ème</sup> ligne, chez les patients adultes atteints d'un CBNPC (de type épidermoïde et de type non épidermoïde) : Keytruda® est une option thérapeutique chez les patients dont la tumeur exprime le PD-L1 ( $\geq 1\%$ ) ; Tecentriq® représente une alternative (à l'exception des CBNPC avec un réarrangement ALK (ALK +)). En l'absence de donnée comparative, leur place vis-à-vis du nivolumab n'est pas connue.<sup>5,6</sup>

## 2 ou 4 semaines : la flexibilité disponible pour vos patients <sup>1</sup>



600 mg toutes les **2 semaines**      1200 mg toutes les **4 semaines**

## Un passage facile d'Opdivo® IV à Opdivo® SC <sup>1</sup>



**Les patients recevant actuellement Opdivo® par voie intraveineuse en monothérapie pourront passer à Opdivo® par voie sous-cutanée.**


## Une solution injectable prête à l'emploi <sup>1</sup>

**Présentation pour Opdivo® SC, prête à l'emploi, à usage unique.**

| Présentation                 | 600 mg    |
|------------------------------|-----------|
| Volume de solution stérile   | 5 mL      |
| Concentration de la solution | 120 mg/mL |

*Photo non contractuelle*

## Une durée d'injection plus courte en SC vs IV <sup>1</sup>



## Une efficacité et une tolérance comparables à la forme IV en monothérapie <sup>1</sup>

### Non-infériorité des propriétés PK entre les formulations SC et IV #

# La concentration sérique moyenne d'Opdivo® sur 28 jours a montré une non-infériorité d'Opdivo® SC (77,4 µg/mL) par rapport à Opdivo® IV (36,9 µg/mL), avec un rapport de la moyenne géométrique de 2,098 (IC à 90 % : 2,001 ; 2,200). La concentration sérique minimale d'Opdivo® à l'état d'équilibre a montré une non-infériorité d'Opdivo® SC (122,2 µg/mL) par rapport à Opdivo® IV (68,9 µg/mL), avec un rapport de la moyenne géométrique de 1,774 (IC à 90 % : 1,633 ; 1,927).

### Profil de sécurité SC/IV en monothérapie comparable ##

## Avec un effet indésirable supplémentaire de réaction au site d'injection (7 % dans le bras Opdivo® SC [n = 247] contre 0 % dans le bras Opdivo® IV [n = 245]).

## Opdivo® fait l'objet d'un plan de réduction des risques relatif aux réactions immunomédiées dans différentes classes d'organes, pouvant apparaître plusieurs mois après la fin du traitement ainsi qu'aux réactions au cours de l'administration comprenant :

**Une carte destinée aux patients.**

**Nous vous recommandons de la consulter au moment de la prescription.**

Nous vous incitons à remettre la carte patient qui leur est destinée lorsqu'ils sont traités par Opdivo®. Cette Mesure Additionnelle de Réduction du Risque (MARR) est également consultable sur le site de l'ANSM : <https://ansm.sante.fr/tableau-marr/nivolumab>

**Il est essentiel de discuter des risques liés au traitement avec vos patients et de leur remettre la carte patient afin qu'ils :**

**Vous signalent immédiatement tout effet indésirable**

**Ne traitent pas leurs symptômes avec d'autres médicaments sans votre avis médical**

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament à votre Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) ou sur <https://signalement-social.sante.gouv.fr>

Pour plus d'informations, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site internet de l'ANSM : <https://ansm.sante.fr>

**Information médicale et Pharmacovigilance**  
Tél. : 01 58 83 84 96 - Fax : 01 58 83 66 98  
mail : [infomed@bms.com](mailto:infomed@bms.com)  
<https://www.bmsmedinfo.fr>

**Pour une information complète incluant les données de sécurité d'Opdivo® SC, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base de données publiques des médicaments :**

**CLIQUEZ ICI**

**Pour prendre rendez-vous :**

**CLIQUEZ ICI**

**Conditions de prescription et de délivrance d'Opdivo® SC :** Médicament réservé à l'usage hospitalier. Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie. Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.

**Prise en charge d'Opdivo® SC <sup>7</sup> :** Opdivo® SC est agréé aux collectivités et inscrit sur la liste des spécialités prises en charge en sus des GHS dans les indications suivantes :

- en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) de type épidermoïde localement avancé ou métastatique après une chimiothérapie antérieure ;

- en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) de type non épidermoïde localement avancé ou métastatique après une chimiothérapie antérieure », uniquement chez les patients en bon état général (ECOG 0 ou 1).

Toute l'équipe Bristol Myers Squibb et moi-même restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires.

Cordialement,  
{{User.Name}}  
Bristol Myers Squibb  
{{userEmailAddress}}

SC : Sous-cutanée ; IV : Intraveineuse ; PK : Pharmacocinétique.

**Références :**  
1. Résumé des Caractéristiques du Produit Opdivo®.  
2. HAS. Avis de la Commission de Transparence Opdivo® SC du 4 février 2026.  
3. HAS. Avis de la Commission de la Transparence Opdivo® du 3 février 2016 dans le CBNPC localement avancé ou métastatique de type épidermoïde.  
4. HAS. Avis de la Commission de la Transparence Opdivo® du 11 janvier 2017 dans le CBNPC localement avancé ou métastatique de type non épidermoïde.  
5. HAS. Avis de la Commission de la Transparence Tecentriq® du 30 mai 2018 dans le CBNPC localement avancé ou métastatique.  
6. HAS. Avis de la Commission de Transparence de Keytruda® du 3 mai 2017 dans le CBNPC localement avancé ou métastatique.  
7. JORF du 11 septembre 2026 relatif à la prise en charge de la forme sous-cutanée d'Opdivo®.

Bristol Myers Squibb ou son prestataire en charge de l'information par démarchage ou prospection visant à la promotion du médicament s'engagent à respecter la Charte de l'information par démarchage ou prospection visant à la promotion du médicament et le référentiel de certification en vigueur. Nos délégués médicaux ou les délégués médicaux de notre prestataire, ainsi que leurs accompagnants s'engagent à suivre les règles de déontologie de Bristol Myers Squibb, et se tiennent à votre disposition pour vous les présenter et répondre à vos éventuelles questions.

Afin d'interagir avec vous, Bristol Myers Squibb, agissant en tant que responsable de traitement, est amené à traiter des données personnelles vous concernant. Ce traitement se justifie par l'intérêt légitime de Bristol Myers Squibb et le cas échéant, par le respect de ses obligations légales. Vous disposez, à tout moment et dans certaines conditions, d'un droit d'accès à vos données personnelles ainsi que le droit de vous les faire communiquer d'un droit d'opposition et de limitation du traitement, et de demander à ce que vos données soient rectifiées, complétées et/ou effacées. Si vous souhaitez exercer l'un de vos droits, veuillez contacter le Délégué à la Protection des Données de Bristol Myers Squibb à l'adresse suivante : [EUDPO@BMS.com](mailto:EUDPO@BMS.com)

Information médicale et Pharmacovigilance  
Tél. : 01 58 83 84 96 - Fax : 01 58 83 66 98  
mail : [infomed@bms.com](mailto:infomed@bms.com)  
<https://www.bmsmedinfo.fr>

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'emails de la part de Bristol Myers Squibb France, vous pouvez vous désinscrire en cliquant sur le lien «Se désinscrire» ci-dessous.

[Politique de confidentialité](#) | [Se désinscrire](#)

Tous les logos du groupe BMS sont des marques commerciales de Bristol Myers Squibb Company.  
©2026 Bristol Myers Squibb Company.  
1506-FR-2600163 - PR - Septembre 2026 - 26/04/60426353/PM/012

